Ambiente 2 Respostas - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal









Acomodação do bebê

O ninho deve ser utilizado como forma de conter o recém nascido, sem mobilizar os movimentos, a fim de evitar deslocamentos e possíveis quedas, além de proporcionar posicionamento terapêutico.





Portinhola da inbucadora

A portinhola deve estar sempre fechada e travada como uma medida de prevenção de quedas, pois o bebê pode se movimentar e cair através da porta da incubadora.



Insumo para higienização das mãos

É necessário o fácil acesso a um produto de higienização das mãos, como, por exemplo, a preparação alcoólica. O produto de higienização das mãos deverá estar tão próximo quanto possível do profissional, ou seja, ao alcance das mãos no ponto de atenção ou local de tratamento, sem a necessidade do profissional se deslocar do ambiente no qual se encontra o paciente.






Transporte do bebê

Bebês menores de 6 meses de idade devem ser transportados no colo do responsável e este em cadeira de rodas, como medida preventiva de quedas.





Identificação da bolsa de nutrição parental em infusão

Bolsas de nutrição parental devem conter rótulo com os dados do paciente a qual se destina. Dessa forma é possível conferir se a bolsa correta está sendo administrada no paciente correto e evitar eventos adversos.



Poltrona para acompanhante

As unidades de terapia neonatal devem possuir poltronas removíveis, com revestimento impermeável, para acompanhante: uma para cada





Técnica para higienização das mãos

Os pontos de assistência devem possuir lembretes sobre importância da higienização das mãos e sobre as indicações e procedimentos adequados para realizá-la.



Identificação do recém nascido na incubadora

A identificação de recém nascidos deve conter minimamente a informação do nome da mãe e o número do prontuário do recém-nascido, bem como outras informações padronizadas pelo serviço de saúde, permitindo a conferência do paciente antes da administração de medicamentos, antes da administração de sangue, antes da administração de hemoderivados, antes de coleta de material para exame e antes da realização de procedimentos invasivos.



Adornos do profissional

Profissionais de saúde devem vedar o uso de adornos durante as atividades assistenciais.



Carro de emergência

As unidades de terapia neonatal devem possuir um carro de emergência para cada cinco leitos.